## 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 소개





- **참진드기**가 매개하는 바이러스 질환입니다.
- 농업, 임업, 등산 등의 야외 활동 중 진드기에 노출되어 감염됩니다.
- 가벼운 감기로 끝나는 경우도 있지만, **오한, 고열, 구토, 설사 등의 증상**이 나타날 수 있습니다.
- **50대 이상**에서 환자가 많으니 주의가 필요합니다.

## SFTS, 이것만 주의하세요!

### 언 제




### 어디서




### 어떻게

"옷 털기, 샤워 등" 예방 철저히





## 진드기에 물린 자국을 발견했거나



## 의심증상이 나타날때

풀밭, 농지 주변에서 활동 후, 발열, 피로감, 식욕저하, 구토, 설사, 출혈 증상이 나타나면







환경부 · 국립환경과학원

- 환경부 생물다양성과 (044) 201-7287
  30103 세종특별자치시 도움6로 11
- 국립환경과학원 생물안전연구팀 (032) 560-7140
  22689 인천시 서구 환경로 42
- 질병관리본부 감염병감시과 (043) 719-7168
  28159 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187
  오송보건의료행정타운





# 안전한 야외활동을 위한
# 야생 진드기 예방요령

중증열성혈소판감소증후군(SFTS)



환경부 · 국립환경과학원

# 1. 가리고 뿌리기




## 진드기 기피제를 사용하세요.





# 2. 지키고 피하기

등산로, 통행로(인도) 이용





## 야생동물 접촉은 위험합니다! (먹는행위·잡는행위)

야생진드기는 야생동물 몸에 붙어 생활할 수 있으므로 접촉 주의




# 3. 털고 씻기

외출 후 옷은 반드시 세탁하고, 몸씻기를 합니다.




진드기가 옷에 붙었을 때
테이프로 떼어 주세요.




물고있는 진드기 발견시 핀셋
등의 도구로 떼고 소독해 주세요.





## 반려동물도 진드기에 물릴 수 있어요

- 산/들로 산책한 후 전신을 꼼꼼히 살펴봅니다.
- 실외에서 키우는 경우 외부기생충 약을 정기적으로 투여합니다.
- 주인없이 돌아다니는 동물에 접촉하는 경우 주의가 필요합니다.



※ 행동요령에 대한 자세한 문의는
국립환경과학원 생물안전연구팀 (032) 560-7143 으로 연락해 주세요.